


2017 Прививки для детей от рождения до 6 лет



↑ ↑ ↑ **Обязательные** ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ **Рекомендуемые** ↓ ↓ ↓



Посмотрите на оборотной стороне дополнительную информацию о прививках и болезнях, которые они предотвращают



Примечания:

- * Две дозы с перерывом в 4 недели для детей возрастом от 6 месяцев до 8 лет, если они получают вакцину впервые, и для некоторых групп детей того же возраста по рекомендации врача.
- ** Две дозы для детей с 8 месяцев, либо одна доза для детей от 2 лет и старше. (Ревакцинация через 5-7 лет)

Обратите внимание:

Если ваш ребёнок пропустил прививку, вам не нужно начинать все с начала - приходите на следующий приём к своему врачу. Если у вас есть вопросы о вакцинации - задайте их своему педиатру.

Если у ребенка есть какие-либо заболевания, которые создают риск инфекции, или он покидает территорию России - поговорите с педиатром о дополнительных прививках, которые могут понадобиться.

Вакцина против клещевого энцефалита (Tick-Borne Encephalitis - TBE) применяется для эндемичных регионов, по согласованию с педиатром. Схема вакцинации: 1ая доза по назначению, 2ая через 1-3 месяца, 3я через 9-12 месяцев.



Ждёте ребёнка?

Чтобы защитить вас и вашего малыша от коклюша - получите вакцину Адасель (Tdap). Её рекомендуется вводить с 27 по 36 неделю беременности. Подробности узнайте у своего врача.

- БЦЖ (BCG) - вакцина против туберкулёза.
- ВГВ (Hep B) - вакцина против вирусного гепатита В.
- ИПВ (IPV) - инактивированная полиомиелитная вакцина.
- БОПВ (OPV) - бивалентная оральная полиомиелитная вакцина.
- ПКВ (PCV) - пневмококковая конъюгированная вакцина (Превенар 13 или Синфлорикс)

- АКДС (DTaP) - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина.
- АДСм (Td) - вакцина против столбняка и дифтерии.
- КПК (MMR) - вакцина против кори, паротита, краснухи.
- RotaV - вакцина против ротавируса.
- Hib - вакцина против гемофильной инфекции типа В.
- Men A+C - вакцина против менингококковой инфекции.

Подготовлено с использованием календаря CDC:



Болезнь	Международное сокращение	Вакцины	Способ заражения	Симптомы болезни	Осложнения болезни
Ветряная оспа	Varicella vaccine	Варилрикс, Окавакс	Воздушно-капельный, контактный	Сыпь, зуд, усталость, головная боль, лихорадка	Вторичная инфекция элементов сыпи, нарушения свертываемости крови, энцефалит (отек мозга), пневмония (воспаление легких)
Дифтерия	DTaP	АКДС, АДС, АДСм, в составе вакцин Инфанрикс, Пентаксим, и др	Воздушно-капельный, контактный	Боль в горле, невысокая лихорадка, слабость, увеличение шейных лимфоузлов	Отек сердечной мышцы, сердечная недостаточность, истинный круп, кома, параличи, смерть
Гемофильная инфекция типа В	Hib	АКТ-ХИБ, Хиберикс, в составе вакцин Пентаксим, Инфанрикс Гекса и др	Воздушно-капельный, контактный	Зависит от локализации инфекции; при попадании инфекции в кровь - симптомы неспецифические	Менингит (инфекция оболочек головного и спинного мозга), нарушения интеллекта, эпиглоттит (угрожающая жизни инфекция, которая может блокировать дыхательные пути и приводить к серьезным проблемам с дыханием), пневмония (воспаление легких), смерть
Гепатит А	HepA	Аваксим 80, Хаврикс 720 и др	Контактный, зараженная пища/вода	Лихорадка, боли в животе, потеря аппетита, слабость, рвота, желтуха (пожелтение кожи и глаз), темная моча; иногда специфические симптомы могут отсутствовать	Хроническая печеночная недостаточность (цирроз печени), артралгии (боли в суставах), поражение почек, поджелудочной железы и крови
Гепатит Б	HepB	Энджерикс В, Регевак, в составе Инфанрикс Гекса и др	Контакт с кровью или биологическими жидкостями	Лихорадка, головная боль, слабость, рвота, желтуха (пожелтение кожи и глаз), боль в суставах; иногда специфические симптомы отсутствуют	Хроническая печеночная недостаточность (цирроз печени), рак печени
Грипп	Flu vaccine	Инфлювак, Ваксигрип, Гриппол Плюс и др	Воздушно-капельный, контактный	Лихорадка, мышечные боли, боль в горле, кашель, выраженная слабость	Пневмония (воспаление легких)
Корь	MMR	Приорикс, дивакина корь-паротит и др	Воздушно-капельный, контактный	Сыпь, лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит	Энцефалит (отек мозга), пневмония (воспаление легких), смерть
Свинка	MMR	Приорикс, дивакина корь-паротит и др	Воздушно-капельный, контактный	Отек околоушных слюнных желез (позади нижней челюсти), лихорадка, головная боль, слабость, боли в мышцах	Менингит (инфекция оболочек головного и спинного мозга), энцефалит (отек головного мозга), воспаление яичек или яичников, глухота
Коклюш	DTaP	АКДС, в составе вакцин Инфанрикс, Пентаксим и др	Воздушно-капельный, контактный	Сильный кашель, насморк, апноэ (паузы при дыхании у грудных детей)	Пневмония (воспаление легких), смерть
Полиомиелит	IPV	Имовак Полио, Полиорикс, в составе вакцин Пентаксим, Инфанрикс Гекса и др	Воздушно-капельный, контактный, оральный	Воспаление горла, лихорадка, тошнота, головная боль; заболевание может протекать бессимптомно	Паралич, смерть
	OPV	60ПВ (она же БиВак Полио)			
Пневмококковая инфекция	PCV	Превенар 13 и Синфлорикс	Воздушно-капельный, контактный	Пневмония (воспаление легких), средний отит, сепсис; заболевание может не иметь специфичных симптомов	Бактериемия (инфекция крови), менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга), смерть
Ротавирус	RotaV (RV)	РотаТек, Ротарикс	Оральный	Диарея, лихорадка, рвота	Тяжелая диарея, обезвоживание
Краснуха	MMR	Приорикс, "против краснухи" и др	Воздушно-капельный, контактный	Сыпь, лихорадка, увеличение лимфатических узлов	Очень опасное заболевание для беременных женщин - может привести к выкидышу, мертворождению, преждевременным родам, врожденным дефектам плода
Столбняк	DTaP	АКДС, АДС, АДСм, в составе вакцин Инфанрикс, Пентаксим и др	Через травмы кожи и слизистых	Тугоподвижность в области шеи и мышц живота, нарушения глотания, мышечные спазмы, лихорадка, судороги, опистотонус (одновременное непроизвольное сокращение всех мышц тела)	Переломы, затрудненное дыхание, смерть
Менингококковая инфекция	Men A+C	Менактра, Менинго А+С	Воздушно-капельный	Головные боли, лихорадка, сыпь на коже	Параличи, снижение интеллекта, психические расстройства, судороги, смерть (при фульминантной форме болезни смерть может наступить через несколько часов после появления первых симптомов)
Клещевой Энцефалит	TBE	ФСМЕ Иммуно, Энцептур, Клещ-Э-Вак и др	Через укусы иксодовых клещей, через молоко больных животных	Головные боли, лихорадка, может не иметь специфических симптомов	Параличи, снижение интеллекта, психические расстройства, судороги, смерть
Туберкулёз	BCG	БЦЖ, БЦЖм	Воздушно-капельный, контактный	Кашель, кровохарканье, беспричинная потеря веса, неспецифические симптомы	Деструктивные процессы в легких и других органах, смерть